

Novalac AC je hrana, posebej razvita za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov s kolikami v obliki bolečin v trebuhu, vetrov in napihovanja zaradi znižane tolerance na laktozo. Novalac AC ima zmanjšano vsebnost laktoze, kar omeji fermentacijo v črevesju oziroma pojav bolečin v trebuhu, vetrov in napihovanja. Novalac AC je primeren za dojenčke in majhne otroke od rojstva do 36. meseca starosti, če jih matere ne dojijo. Do 6. meseca starosti se lahko uporablja kot edina prehrana, po 6. mesecu starosti pa lahko Novalac AC po nasvetu zdravnika uporabljate kot del raznovrstne prehrane. / *Novalac AC je hrana, posebno razvijena za zadovoljevanje prehrabnih potreba dojenčadi s kolikami v obliki bolova v trebuhu, vetrova i nadutosti zbog smanjene tolerancije na laktozu. Novalac AC ima smanjen sadržaj laktoze što ograniči fermentaciju u crijevima odnosno pojavu bolova u trbuhu, vjetрова i nadutosti. Novalac AC primjeren je za dojenčad i malu djecu od rođenja do 36. mjeseca starosti, ako majka ne doji. Novalac AC zadovoljava sve prehrabne potrebe dojenčadi do 6. mjeseca starosti, a za dojenčad stariju od 6 mjeseci prema preporuci liječnika dio je raznolike prehrane.*

Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Novalac AC uporabljajte samo pod zdravniškim nadzorom pri dojenčkih, ki imajo simptome, za katere je živo namenjeno. Proizvoda ne smete uporabljati kot edini vir hrane po 6. mesecu starosti in/ali v primeru galaktozemije. Posebna pozornost je potrebna tudi pri dojenčkih z oslabiljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Proizvod ni primeren za parenteralno uporabo ali za hranjenje po sondi. Pakirano v kontrolirani atmosferi. / *Majčino mleko najbolja je hrana za dojenčad. Novalac AC se mora uzimati pod liječničkim nadzorom i davati samo dojenčadi koja pokazuju simptome kojima je proizvod namijenjen. Proizvod nije primjeren za uzimanje kao jedini izvor prehrane nakon 6. mjeseca starosti i/ili u primjeru galaktozemije. Poseban oprez je potreban i kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Proizvod nije primjeren za parenteralnu uporabu. Novalac AC nije prikladan za hranjenje putem sonde. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.*

Odmerjanje / Doziranje

Starost dojenčka (meseči) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Število obrokov na dan/ Broj obroka na dan	6	5	5	4	3*	2*
Število meric za pripravo enega obroka/ Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3	4	5	7	7	8
Količina vode (ml)/Količina vode (ml)	90	120	150	210	210	240

*Kot del raznolike prehrane/ Kao dio raznolike prehrane

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca AC. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkovi starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli. / *Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca AC. Jednu mjerico rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako Vam liječnik nije drugačije savjetovao, držite se preporuke u tablici.*

Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem in hladnem mestu, zaščiteno pred svetlobo. • Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjene na dnu pločevinke. • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite. • Ne shranjujte nepopolnega obroka. Ostanek zavrzite. / *Uvijek pripremite sveži obrok. • Čuvajte na suhom mjestu, zaštićeno od svjetla i topline. • Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu limenke. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.*

Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švica
Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
Sjedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska
Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb
Kontakt za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH.
Broj i datum rješenja u FBiH: Broj rješenja u upisu u Registar RS:
Proizvedeno u EU/Proizvedeno u EU.



Novalac AC

Živilo za posebne zdravstvene namene
Za prehransko uravnavanje kolik v obliki
bolečin v trebuhu, vetrov in napihovanja

Hrana za posebne medicinske potrebe
Za dijetalnu prehrano dojenčadi
s kolikami v obliki bolova u
trbuhu, vjetрова i nadutosti



Zmanjšana vsebnost laktoze/
Smanjen sadržaj laktoze

0-36 mesecev/
mjeseci

400 g e

Energijska vrednost/Energetska vrijednost	100 g	100 ml
	2103	273
	502	65
Maiščobe/Masti	g	25
- od tega nasičene maiščobe/	g	11,7
- od kojih zasičene masne kiseline		
- linolna kislina/linolna kiselina	g	4,5
- alfa linolenska kislina/alfa linolenska kiselina	mg	405
- DHA (dokozaheksaenojska kislina/	mg	120
dokozaheksaenska kiselina)		
- ARA (arahidonska kislina/arahidonska kiselina)	mg	30
Ogljikovi hidrati / Ugljikohidrati	g	58,1
- od tega sladkorji / od kojih šećeri	g	18,6
laktoza	g	18
GOS (galakto-oligosaharidi)	g	1,85
Prehranske vlaknine / Vlakna	g	1,2
Beljakovine / Bjelancevine	g	10,4
Sol	g	0,475
Vitamins		
A	µg	440
D	µg	11,5
E	mg	8,7
K	µg	60
C	mg	60
Tiamin	mg	0,8
Riboflavin	mg	1,2
Niacin	mg	4,5
B6	mg	0,5
Folna kislina / Folna kiselina	µg	85
Folat	µg-DFE	150
B12	µg	1,5
Biotin	µg	18
Pantotenska kislina / Pantotenska kiselina	mg	5
Minerali		
Natrij	mg	190
Kalij	mg	590
Klorid	mg	400
Kalcij	mg	500
Fosfor	mg	335
Magnezij	mg	40
Železo / Željezo	mg	5
Cink	mg	3,5
Baker / Bakar	mg	0,38
Mangan	mg	0,035
Fluorid	mg	<0,45
Selen	µg	26
Krom	mg	<45
Molibden	mg	<45
Jod	µg	95
Holin / Kolin	mg	170
Inozitol	mg	80
Taurin / Taurin	mg	40
L-karnitin	mg	20

Posneto mleko, maltodekstrini, rastlinska olja (palmovo, sojino, kokosovo), galakto-oligosaharidi (mleko), laktoza, ribje olje (DHA) (mleko), trikalcijev citrat, holin bitartrat, emulgator (sojin lecitin), natrijev klorid, vitamini (natrijev askorbat, DL-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, nikotinamid, askorbinska kislina, tiaminijev hidroklorid, riboflavin, retinil acetat, piridoksinijev hidroklorid, folna kislina, fitomenadiol, kolekalciferol, D-biotin, cianokobalamin), inozitol, železov difosfat, L-cistin, L-triptofan, kalcijev klorid, kalijev klorid, mlečne kulture (B. lactis, L. rhamnosus), olje iz glive Mortierella alpina (ARA) (mleko), trikalcijev fosfat, taurin, dinatrijev fosfat, L-karnitin, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidanti (izvleček bogat s tokoferoli), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat, trikalcijev citrat, trinatrijev citrat. / *Obrano mljeko, maltodekstrini, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), galakto-oligosaharidi (mljeko), laktoza, riblje ulje (DHA) (mljeko), trikalcijev citrat, kolini bitartrat, emulgator (sojin lecitin), natrijev klorid, vitamini (natrijev askorbat, DL-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, nikotinamid, askorbinska kiselina, tiamin-hidroklorid, riboflavin, retinil acetat, piridoksin-hidroklorid, folna kiselina, fitomenadiol, kolekalciferol, D-biotin, cianokobalamin), inozitol, železov difosfat, L-cistin, L-triptofan, kalcijev klorid, kalijev klorid, mliječne kulture (B. lactis, L. rhamnosus), ulje gljive Mortierella alpina (ARA) (mljeko), trikalcijev fosfat, taurin, dinatrijev fosfat, L-karnitin, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat, trikalcijev citrat, trinatrijev citrat.*

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.

- 1 Stekleničko in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut./ Bočicu i poklopac sa dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.
- 2 Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut./ Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
- 3 Vodo v lončku ohladite na 40 °C in jo prelajte v stekleničko./ Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i prelajte je u bočicu.
- 4 V stekleničko s priloženo merico vsujete predpisano število meric./ Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.
- 5 Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi./ Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.
- 6 Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C) oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno./ Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.