

Upotreba

Novalac 3 napitak na bazi mlijeka/mlijeko nakon dojenja s dodanim vitaminima i mineralima namijenjen je maloj djeci od 1. do 3. godine. Pripremljen obrok jedna bočica napitka Novalac 3 sadrži kalcij i vitamin D (potrebni za normalan rast i razvoj kostiju u djece), željezo (doprinosi normalnom kognitivnom razvoju djece) i jod (doprinosi normalnom rastu djece). Novalac 3 je izvor vitamina A, B1, B2, C, D i biotina te je bogat vitaminima B12 i K1. Novalac 3 primjeren je za nastavak hranjenja nakon upotrebe Novalaca 2 ili neke druge prijelazne mliječne hrane. Ima dobar okus vanilije.

Doziranje

Vašemu djetetu možete dati topao (< 37°C) ili hladan napitak Novalac 3, ili ga upotrijebiti i za pripremu dječjih žitarica i ostalih obroka kao dio uravnotežene prehrane. Jedna limenka od 400 g dovoljna je za pripremu 11 obroka. Priprema u bočici: Za svakih 30 ml vode dodajte jednu mjericu Novalaca 3. Jedna mjerica sadrži 4,5 g praha. Za 100 ml obroka uspite u bočicu 3 poravnate mjerice praha (15 g). Priprema u čaši: U 240 ml vode dodajte 8 mjerica Novalaca 3.

- Uvijek pripremite svježi obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od svjetla.
- Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu limenke.
- Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Sjedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska. Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10010 Zagreb - Buzin, Hrvatska. Distributer: Medis, d.o.o., Brnčeva 1, Ljubljana, Republika Slovenija. Proizvedeno u EU; uvezeno iz Slovenije.

Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. Uvoznik za BA: Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500.

Broj i datum rješenja u FBiH:
04-33-2759/22-DP od 10.06.2022.
Broj rješenja o upisu u Registar RS:
P35/22 od 11.11.2022

1514M46G

30155463



3 831061 011714

MEDIS

www.novalac.hr
www.novalac.ba

1-3 godine


Neto količina: 400 g e

Novalac

3

HR: Napitak na bazi mlijeka s
dodanim vitaminima i mineralima
namijenjen maloj djeci

BiH: Mlijeko nakon dojenja
za malu djecu



Novalac

Hranjiva vrijednost

	100 g	100 mL	%PU*
Energetska vrednost			
	kJ	1990	269
	kcal	474	64
Masti	g	19	2,6
- od toga zasićene masne kiseline	g	7,6	1
- Linolna kiselina	g	4,4	0,6
- Alfa-linolenska kiselina	mg	530	72
Ugljikohidrati	g	64,4	8,7
- od kojih šećeri	g	38,2	5,2
Bjelančevine	g	11	1,5
Sol	g	0,325	0,04
Vitamini			
Vitamin A	µg	540	73
Vitamin D	µg	8,5	1,1
Vitamin E	mg	4	0,5
Vitamin K	µg	30	4,1
Vitamin C	mg	60	8,1
Tiamin	mg	0,6	0,08
Riboflavin	mg	1	0,14
Niacin	mg	6	0,8
Vitamin B6	mg	0,7	0,09
Folna kiselina	µg	120	16
Vitamin B12	µg	2	0,3
Biotin	µg	20	2,7
Pantotenska kiselina	mg	2,5	0,3
Minerali			
Kalcij	mg	650	88
Fosfor	mg	385	52
Magnezij	mg	45	6,1
Željezo	mg	9,5	1,3
Cink	mg	4	0,5
Bakar	mg	0,35	0,05
Mangan	mg	0,035	0,005
Jod	µg	100	14

*PU (preporučeni unos)

Sastojci

Djelomično obrano mlijeko, maltodekstrini, laktoza, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo, ulje uljane repice), fruktoza, dekstroza, trikalcijev citrat, trikalcijev fosfat, vitamini [Askorbinska kiselina (vitamin C), nikotinamid (niacin), DL-α-tokoferol acetat (vitamin E), kalcijev-D-pantotenat, riboflavin, tiamin hidroklorid, retinil acetat (vitamin A), piridoxin hidroklorid (vitamin B6), folna kiselina, D-biotin, fitomenadion (vitamin K), kolekalciferol (vitamin D), cijanokobalamin (vitamin B12)], etil-vanilin, željezov sulfat, magnezijev oksid, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

Uputa za pripremu



PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.



1 Očistite bočicu i dudu koju ćete upotrijebiti te sterilizirajte u kipućoj vodi 5 minuta.



2 Vodu za pripremu obroka prokuhajte. Neka kluča bar 5 minuta.



Vodu u lončiću ohladite na 40° C i prelijte je u bočicu.



Uspite u bočicu ili čašu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



Zatvorite bočicu za bebe plastičnim poklopcem i dobro promućkajte odnosno promiješajte dok se prašak potpuno ne otopi u vodi.



Provjerite temperaturu (37 ° C) na unutarnjoj strani zapešća.

Novalac 3 možete upotrijebiti kao dodatak za pripremu mliječnih obroka.